



เจ้าหมึกตัวร้าย...

อันตรายถึงชีวิต

“หมึกบลูริง” ปังกินไม่ได้!
พิษร้ายแรงกว่างูเห่า 20 เท่า



- หมึกสายวงน้ำเงิน หรือ หมึกบลูริง เป็นหมึกยักษ์ที่ตัวเล็กแค่ 4 เซนติเมตร
- จุดเด่นคือวงกลม "สีน้ำเงิน" ทั่วทั้งตัว

อันตราย

หมึกบลูริง มีสารพิษที่มีความร้ายแรงมากผสมอยู่ในน้ำลาย สารพิษนั้น เรียกว่า **เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin)** ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า



หากพบเห็นหมึกที่มีลักษณะเช่นนี้
“ห้ามสัมผัส”
หรือ
“บริโภคเด็ดขาด”

เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin)

- เป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาท โดยปริมาณพิษที่มนุษย์รับประทานแล้วเสียชีวิต คือ ปริมาณ 1 มิลลิกรัม ซึ่งมีความรุนแรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,200 เท่า
- ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษ ยิ่งไปกว่านั้นพิษนี้ทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ดังนั้น การใช้ความร้อนปกติในการปรุงอาหารจึงไม่สามารถทำลายพิษได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ใช้เทคนิคการกดรัดและตรึงอวัยวะส่วนนั้นไม่ให้เคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อให้พิษไม่แพร่กระจายเข้าระบบไหลเวียนโลหิต และรีบนำส่งแพทย์โดยด่วน

อาการ

- I. มีอาการชา น้ำลายไหล คลื่นไส้ อาเจียน
- II. หอ่งเสียร่วมกับปวดท้อง ซึ่งอาการปวดท้องจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
- III. มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- IV. ในผู้ป่วยที่ได้รับพิษปริมาณมากพิษจะเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้หายใจไม่ออก เนื่องจากกล้ามเนื้อกะบังลมและหน้าอกไม่ทำงาน จึงไม่สามารถนำอากาศเข้าสู่ปอดได้
- V. และผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 4-6 ชั่วโมง แต่บางเคสมีรายงานพบว่าเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเพียง 20 นาทีเท่านั้น

แหล่งที่มา : หมึกสายวงน้ำเงิน(ออนไลน์):ThaiToxicMarineLife
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(dmcr.go.th),
วันที่ 2 ธันวาคม 2563



สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
@foodsantation
Food Sanitation Division Health
Department BMA

