

กินหมูดิบ (เสี่ยง) หูดับ



โรคไขหูดับคืออะไร?

โรคไขหูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส (streptococcus suis) โดยเชื่อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วย

สาเหตุ

การบริโภคหมูดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ทั้งเนื้อ เครื่องใน และเลือด ที่มีเชื้อ

การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องใน และเลือดหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คน ทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อเมือก



การป้องกัน “โรคหูดับ”



หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ



ปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อน



เลือกซื้อเนื้อหมูที่ได้มาตรฐาน ไม่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ และซ้ำ



ผู้ที่มิบาดแผลต้องทำงานเกี่ยวกับหมูโดยตรง

“ควรปิดแผล” ให้มิดชิด และ “สวมถุงมือ” ล้างมือ

หลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง



ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค ควรสวมรองเท้าบูทยาง

สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน

อาการป่วย



ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าในร่างกายจะป่วย หลังติดเชื้อ **ประมาณ 3-5 วัน** อาการที่พบ คือ ไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบและเสื่อมจนหูหนวกหูดับ และอาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

